

VACUNA MENINGOCOCO

PAI 2026

Lic. En Enfermería Robles Diego . 2 de Septiembre 2026

Vacuna Meningococo



Nimenrix®




Menveo®



MenQuadfi®.

VACUNAS CONJUGADAS PARA NEISSERIA MENINGITIDES GRUPOS A/C/Y/W.

MENINGOCOCO TETRAVALENTE: MENVEO NUEVA PRESENTACIÓN




PRESENTACIÓN

- Caja primaria: 10 dosis
- UNICO VIAL POR DOSIS **No requiere reconstitución**
- Cada vial contiene: solución inyectable 0.5ml, monodosis, que contiene todos los componentes de la vacuna.

PROPOSITO DE LA VACUNA

- ✓ Controlar la EMI (**Enfermedad Meningocócica Invasiva**) a fin de disminuir la incidencia, morbilidad y mortalidad secundarias a infecciones graves por los serogrupos de Nm (*Neisseria meningitidis*) incluidos en la vacuna en lactantes y niños pequeños.
- ✓ Controlar la EMI en lactantes y niños pequeños
- ✓ Disminuir la incidencia de la enfermedad, así como las complicaciones neurológicas, auditivas, amputaciones y muerte por EMI en niños de Argentina



DOSIS, VIA Y SITIO DE APLICACIÓN:


- Dosis: 0,5 ml
- Vía: intramuscular
- Sitio de aplicación:

Menores de 12 meses cara antero lateral del muslo


Mayores de 12 meses musculo deltoides



**INYECCION
INTRAMUSCULAR
EN EL DELTOIDES**



- Lactantes y niños <12 meses



**INYECCION INTRAMUSCULAR
CARA ANTEROLATERAL DEL
MUSLO (VASTO EXTERNO).**

LINEAMIENTOS DE LA VACUNA MENINGOCOCO 2026



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
Año de la Grandeza Argentina

Informe

Número: IF-2026-55178037-APN-SSPYPS#MS

CIUDAD DE BUENOS AIRES

Miércoles 3 de Junio de 2026

Referencia: Recomendaciones para la utilización de las vacunas antimeningocócicas conjugadas tetravalentes (ACWY) disponibles en Argentina durante el año 2026

Recomendaciones para la utilización de las vacunas antimeningocócicas conjugadas tetravalentes (ACWY) disponibles en Argentina durante el año 2026.

En Argentina, la estrategia de vacunación para huéspedes especiales con vacuna antimeningocócica tetravalente conjugada (ACWY) se implementó en el año 2012. Posteriormente, esta vacuna fue incorporada al Calendario Nacional de Vacunación (CNV) mediante la Resolución Ministerial N.º 10/2015, iniciándose su implementación regular a partir de enero de 2017.

POBLACION OBJETIVO (COHORTE)

- Niños que cumplan 3 meses a partir del 1° de enero de 2017
- Adolescentes que cumplan 11 años a partir del 1° de enero de 2017

El esquema vigente contempla:

- En lactantes: 2 dosis (esquema primario) y 1 dosis de refuerzo, administrados a los 3, 5 y 15 meses de edad, respectivamente.
- En adolescentes: una dosis única a los 11 años.

Durante el año 2026, el Ministerio de Salud de la Nación proveerá vacunas antimeningocócica tetravalentes conjugadas correspondientes a las siguientes marcas comerciales: **Nimenrix®**, **Menveo®** y **MenQuadfi®**.

En este contexto se recomienda:

- Completar el esquema primario con la misma vacuna siempre que sea posible
- Priorizar el uso del stock de vacuna Nimenrix® para completar esquemas primarios de lactantes que ya iniciaron su vacunación con esta vacuna
- En caso de iniciar esquemas en lactantes, hacerlo con vacuna Menveo®
- Para la dosis de refuerzo (15 meses) de niños con esquema básico completo, puede utilizarse la vacuna Nimenrix® o Menveo® o MenQuadfi® en forma indistinta.
- Priorizar el uso de vacuna MenQuadfi® para la vacunación de adolescentes
- En caso de no disponer de la vacuna recomendada al momento de la consulta, administrar la vacuna disponible, a fin de evitar oportunidades perdidas de vacunación y retrasos en los esquemas.

Recomendaciones para la vacunación antimeningocócica de CNV en lactantes y adolescentes durante el contexto de la coexistencia de vacunas Nimenrix®, Menveo® y MenQuadfi® en el sector público

Edad	Estado previo de vacunación contra meningococo	Indicación
3 meses	Sin dosis previas (inicio de esquema)	Menveo®
5 meses	1° dosis Nimenrix®	Nimenrix®
	1° dosis Menveo®	Menveo® / MenQuadfi®
	1° dosis MenQuadfi®	MenQuadfi® / Menveo®
15 meses	Esquema primario completo (2 dosis) con Nimenrix®	Refuerzo con Nimenrix®
	Esquema primario completo (2 dosis) con Menveo®	Refuerzo con Nimenrix®, Menveo® o MenQuadfi® según disponibilidad
	Esquema primario completo (2 dosis) con MenQuadfi®	Refuerzo con Nimenrix®, Menveo® o MenQuadfi® según disponibilidad
11 años	-	MenQuadfi®, Menveo®, Nimenrix®

EFFECTOS ADVERSOS:

Lo mas frecuentes

Generales: Fiebre, cansancio(fatiga), cefalea, somnolencia, anorexia, irritabilidad

Locales: Hinchazón, dolor y enrojecimiento en el lugar en el que se administró la inyección

Precauciones especiales de conservación:

- Conservar en la heladera entre 2° c a 8°c (NO congelar)
- Conservar los viales en el embalaje original para proteger de la luz

BEXSERO® Vacuna antimeningocócica multicomponente del grupo B, recombinante 4C-MenB

- Dosis: 0,5 ml- Vía intramuscular
- Esquema: 2 dosis con intervalo 4 semanas. La necesidad de refuerzo no esta establecida. No hay indicación de revacunación por el momento.
- Presentación: Jeringa prellenada Durante su almacenamiento puede formar un depósito fino blanquecino. Agitar muy bien la vacuna antes de utilizarla para formar una suspensión homogénea.
- Lugar de aplicación: región superior del brazo en el músculo deltoides en niños mayores y adultos y en bebes menores en cara antero lateral del muslo.



Se proveen dos agujas de diferente longitud en el estuche, elegir la apropiada para asegurar la administración intramuscular.

EFFECTOS ADVERSOS

- Locales: Eritema, dolor e induración en el lugar de la inyección.
- Generales: Lactantes: Febrícula o fiebre, irritabilidad, trastornos de la alimentación, diarrea, vómitos, llanto inusual, tendencia al sueño.
- En adolescentes: Malestar general, cefalea, náuseas, mialgias,

Contraindicaciones:

- Hipersensibilidad a algunos de los componentes del producto
- Enfermedades agudas graves, que impliquen compromiso del estado general.

Precauciones:

- Episodios subfebriles ($< 38^{\circ}\text{C}$) o enfermedad moderada, se recomienda postergar la administración de la vacuna hasta que la persona haya mejorado.
- Trombocitopenia o cualquier alteración de la coagulación.

¡Muchas gracias!

Curso PAI · Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez