

VACUNA HEPATITIS A

PAI 2026 MODULO 6

Enf. Dematte Rocio

HEPATITIS A:


ES UNA INFLAMACION AL HIGADA CAUSADO POR EL VIRUS DEL HEPATITIS A.

En la Argentina, la hepatitis A, llego a causar el 90% de las hepatitis agudas que afectaban a la población pediátrica, sin embargo, gracias a la vacunación, desde el 2007 no se realizaron trasplantes de hígado por falla hepática fulminante debido a infección por virus de la hepatitis A en este grupo poblacional.

COMO SE TRANSMITE:

Por vía fecal-oral

- ✓ A través de manos
- ✓ Por alimentos contaminados con el virus
- ✓ Por agua contaminada con el virus



SINTOMAS:

Los mas comunes

- Fiebre
- Nauseas
- Vómitos
- Perdida de apetito
- Cansancio

A veces causa dolor en el hígado, piel u ojos amarillos (Ictericia)

Sin embargo muchas personas infectadas (especialmente los niños) tienen pocos síntomas o ninguno

La mayor complicación de la enfermedad es la insuficiencia hepática aguda que puede hacer necesario el trasplante del hígado y tiene una alta mortalidad

ACCIONES DE ENFERMERÍA: EL ANTES, DURANTE Y EL DESPUES

- Revisar el certificado de vacunación de la persona
- La entrevista PREVIA a la persona a vacunar

Estas acciones sirven para:

- Evitar administrar dosis innecesarias.
- Conocer efectos adversos a dosis previas.
- Comprobar si es necesario administrar otras vacunas, además de las previstas



- El lavado de manos
 - La selección y preparación de la vacuna
 - La asepsia de la piel
 - La definición de vía y lugar de inyección
 - La correcta eliminación de residuos
 - La prevención de eventos adversos
 - El registro vacunal

PRESENTACION:



Entre 1 a 15 años:
0,5 ML

≥ 16 años:
1 ML



**COHORTE EN ARGENTINA ES NACIDOS A PARTIR
DEL AÑOS 2004: 1 DOSIS**

Otras presentaciones de la vacuna hepatitis A

Nombre Comercial	Edad	Dosis	Edad	Dosis
Cepa viral HM 175/ HAVRIX®	1-18 años	720 UE = 0,5 ml	19 años	1440 UE = 1 ml
Cepa viral CR326/ VAQTA®	1-17 años	25 U = 0,5 ml	18 años	50 U = 1 ml
Cepa viral GBM/ AVAXIM®	1-17 años	80 U = 0,5 ml	18 años	160 U = 1 ml
Cepa viral RG SB/ VIROHEP A® EPAXAL®	1-16 años	12 UI = 0,25 ml	17 años	24 UI = 0,5 ml
Células diploides humanas inactivadas HEALIVE®	16 años o más	500,0 U = 1 ml		

Leer atentamente el prospecto antes de su aplicación

VACUNA HEPATITIS A: presentación, dosis, vía

- Tipo de vacuna: **INACTIVADA**

Existen diferentes presentaciones de acuerdo al laboratorio

Se puede administrar en forma simultánea con las vacunas de calendario

- Presentación: monodosis
- Lugar de aplicación: en región deltoides
- Vía: intramuscular
- Dosis: 0.5 ML (menores de 16 años) 1.0 ML mayores de 16 años
- Conservación: de 2°C a 8°C



NO debe congelarse

Efectos adversos

Locales: Dolor, tumefacción en el sitio de la inyección, son leves y de corta duración

Generales: Cefalea es el efecto adverso mas frecuente, fiebre, dolor abdominal (epigastralgia), náuseas, vómitos y mareos en menor grado.

Hallazgo de laboratorios: aumento de transaminasas, hiperbilirrubinemia, eosinofilia y proteinuria



ESQUEMA DE VACUNACION: A PARTIR DE LOS 12 MESES DE EDAD

- En argentina la incorporo al Calendario Nacional con UNA sola dosis al año vida (estrategia avalada por la OMS)
- Pacientes inmunosuprimidos es de DOS dosis esquema sugerido es de 0-6 a 12 meses. (Niños con inmunodeficiencia adquirida, TMO, etc.)
- Los pacientes con enfermedad hepática crónica tiene indicación precisa de recibir la vacuna

CALENDARIO NACIONAL DE VACUNACIÓN

Vacunas	BCG (1)	Hepatitis B HB (2)	Neumococo Conjugada (3)	Quíntuple Pentavalente DTP-HB-Hib (4)	Polio		Rotavirus (7)	Meningococo (8)	Gripe (9)	Hepatitis A HA (10)	Triple Viral SRP (11)	Varicela (12)	Cuádruple o Quíntuple Pentavalente DTP-Hib (13)
					IPV (5)	OPV (6)							
Edad													
12 meses			refuerzo							única dosis	1º dosis		

Ministerio de la salud recomienda la vacunación contra la VHA en adultos con un esquema de dos dosis para las siguientes situaciones independientemente de la edad:

- **Varones que tienen relaciones sexuales con otro varones, mujeres trans, trabajadoras y trabajadores sexuales**
- **Personas con desordenes de coagulación.**
- **Enfermedad hepática crónica**
- **Personal de laboratorio que manipula muestras del virus de la Hepatitis A.**
- **Personal gastronómico.**
- **Personal de jardines maternos que asiste a niños y niñas menores de un año de vida.**
- **Personal de salud si la serología salió negativa**

Recomendaciones:

- ❖ Además de la vacuna, es una forma efectiva de prevenir la hepatitis A implementando medida de higiene, como lavarse las manos después de ir al baño o cambiar pañales y antes de preparar o ingerir alimentos.
- ❖ Se recomienda el consumo de agua potable y medidas de saneamiento ambiental, como la correcta eliminación de la material fecal. Sino hay seguridad de que el agua es potable se debe hervirla o potabilizarla con dos gotas de lavandina por cada litro de agua.



Vacuna para prevenir
la Hepatitis A



Lavado frecuente
de manos



Lavado de
frutas y verduras

¡Muchas gracias!

Curso PAI · Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez