

VACUNA FIEBRE AMARILLA

Curso PAI 2026 - HNRG

Nombre: Lic. Sergio G. Ramos


Fecha: 16 de Septiembre 2026

Composición de la vacuna de Fiebre Amarilla (FA)

- Es una suspensión liofilizada de **virus vivos atenuados** de la cepa **17D-204** (Stamaril®) y de la cepa **17 DD** (Bio-Manguinhos®) obtenida en **huevos embrionados de gallina**.



HUEVOS
EMBRIONADOS
DE GALLINA



VIRUS VIVOS
ATENUADOS



SUSPENSIÓN
LIOFILIZADA



El proceso de atenuación y producción se realiza en huevos embrionados de gallina, garantizando seguridad, calidad y eficacia.

CEPA
17D-204
(Stamaril®)



CEPA
17 DD
(Bio-Manguinhos®)



La vacuna contra la fiebre amarilla es **segura, eficaz y fundamental** para prevenir la enfermedad.

Presentación vacuna de FA

Vacuna Stamaril®

Protección
contra la fiebre
amarilla



Presentación

La vacuna Stamaril® se presenta en mono o multidosis.



Reconstitución

La monodosis se reconstituye con una jeringa que contiene cloruro de sodio al 0.4%; la multidosis, con cloruro de sodio al 0.9%, que se adjunta al envase.



Luego de la reconstitución

Una vez reconstituidas deben agitarse fuertemente hasta lograr su completa disolución, previo a su administración.



Recordar:

La correcta reconstitución y manipulación de la vacuna garantiza su eficacia y seguridad.

Vacuna Bio-Manguinhos®



Presentación

La vacuna Bio-Manguinhos® se presenta como multidosis.



Multidosis

- **De 5 dosis:** se reconstituye con el diluyente (2,5 ml) suministrado por el productor.
- **De 50 dosis:** se reconstituye con 25 ml de diluyente. La reconstitución de este último debe realizarse en dos pasos: primero, con 1 ml de diluyente, y luego, el traspaso al frasco que contiene el resto de la solución.



Luego de la reconstitución

Hay que diluir lentamente el liofilizado con el diluyente, el fabricante recomienda agitar el frasco reconstituido en forma suave y periódica.



Características del producto reconstituido

Es de color blanquecino y puede contener algunos grumos y filamentos que se originan en el sustrato de producción, es decir, el huevo de gallina.



Recordar:

La correcta reconstitución y manipulación de la vacuna garantiza su eficacia y seguridad.

Conservación de la vacuna de Fiebre Amarilla (FA)



Indicaciones y edad para la vacunación



¿A QUIÉNES ESTÁ DIRIGIDA?

Personas que residen en zonas con riesgo de circulación viral de fiebre amarilla.



EDAD DE APLICACIÓN

A partir de los **12 meses** de edad.



IMPORTANTE

- La vacuna contra la fiebre amarilla es segura y eficaz.
- Una sola dosis brinda protección de por vida.



La vacunación es una medida clave para proteger tu salud y la de tu comunidad.

Se trata de una vacuna sujeta a Reglamento Sanitario Internacional y puede indicarse a partir de los 9 meses de edad o a viajeros con destino a áreas de riesgo o con requerimiento internacional.

El Calendario Nacional de Inmunizaciones contempla la vacunación de personas que residen en zonas con riesgo de circulación viral de fiebre amarilla, a partir de los 12 meses de edad (Formosa, Misiones, Corrientes, Jujuy (departamentos de Ledesma, Santa Bárbara, San Pedro, Valle Grande), Salta (departamentos de General José de San Martín, Orán, Rivadavia, Anta) y Chaco (departamento de Bermejo).

Dosis y vía de administración



VACUNA CONTRA FIEBRE AMARILLA



DOSIS

Se aplicará una dosis de **0,5 ml** (no debe reducirse la dosis en niños), **por vía subcutánea** (se puede aplicar intramuscular).



LUGAR DE APLICACIÓN

Región anterolateral del muslo (en los niños que no caminan) o parte superior del brazo (músculo deltoides).



Muslo anterolateral



Músculo deltoides



VÍA DE ADMINISTRACIÓN

Subcutánea (se puede aplicar intramuscular).



La vacunación es segura y efectiva.
Consultá siempre en tu centro de salud.

ESQUEMA



PRIMERA DOSIS
entre los 12 y 18 meses.



DOSIS DE REFUERZO
a los 11 años.



PERSONAS DE 2 A 59 AÑOS, SIN DOSIS ANTERIORES, deben aplicarse el esquema de dosis única.



La vacuna contra la fiebre amarilla previene una enfermedad grave. Es gratuita y obligatoria en las zonas con riesgo de transmisión.



Cuidarte es cuidar a los demás.



Efectos Adversos

LEVES A MODERADOS

Pueden ocurrir hasta en el **30%** de los vacunados, entre los días **1 y 18** post-vacunación.



Cefalea



Fiebre



Malestar general



Reacción local en el sitio de la inyección



Suelen ser autolimitados y desaparecen en pocos días sin dejar secuelas.

SEVEROS

Son más raros y ocurren a diferentes intervalos post vacuna.

Los más importantes son:



ENFERMEDAD VICEROTROPISMO

Aparece **1-18** días posterior a la aplicación de la vacuna, es un cuadro similar a la infección causada por el virus salvaje, generalmente fatal.

La incidencia es más alta en los **mayores de 60 años**.



ENFERMEDAD NEUROTROPISMO

Aparece **3-56** días con posterioridad a la aplicación de la vacuna y se caracteriza por fiebre y signos neurológicos variables (confusión, meningismo, convulsiones, parálisis).

La incidencia es más alta en los **menores de 6 meses**.



REACCIONES ANAFILÁCTICAS

Pueden ocurrir en general en personas con alergia al huevo.



ANTE CUALQUIER SÍNTOMA consultar inmediatamente al centro de salud.



La vacuna contra la fiebre amarilla es segura y efectiva. Los beneficios de la vacunación superan ampliamente los riesgos de eventos adversos.

Uso simultáneo con otras vacunas



CON VACUNAS INACTIVADAS

La vacuna contra la fiebre amarilla se puede administrar **simultáneamente** con otras vacunas inactivadas.



SE PUEDEN APLICAR EL MISMO DÍA en diferentes sitios anatómicos.



CON VACUNA TRIPLE VIRAL (VIRUS VIVOS ATENUADOS)

En caso de necesitar administrarla junto con vacuna triple viral (virus vivos atenuados), es recomendable **separarlas por 4 semanas**.

PRIMERA OPCIÓN
(recomendada)



SEGUNDA OPCIÓN
(si no es posible separar)



De no ser posible separarlas por 4 semanas, deberán aplicarse **el mismo día** (en diferentes sitios anatómicos).



SIEMPRE RESPETAR LAS RECOMENDACIONES DEL CALENDARIO NACIONAL DE VACUNACIÓN Y LOS CRITERIOS DEL EQUIPO DE SALUD.



¡Muchas gracias!

Curso PAI · Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez