

VACUNA FIEBRE HEMORRÁGICA ARGENTINA

Curso PAI 2026- HNRG

Lic. Sergio G. Ramos · 16 de Septiembre 2026

Composición de la vacuna de Fiebre Hemorrágica Argentina (FHA)

- Es Virus vivo atenuado Junín Ceba Candid #1
- Producida por el Instituto Nacional de Enfermedades Virales Humanas "Dr. Julio Maiztegui", y ha demostrado ser inmunogénica y con un 95,5% de efectividad para evitar la enfermedad.

Conservación de la vacuna de Fiebre Hemorrágica Argentina (FHA)

- Se presenta en frascos liofilizado conteniendo **10 dosis** de vacuna con una ampolla diluyente de **5,5 ml** de agua estéril para inyectable.
- Los frascos liofilizados se deben conservar en el nivel central entre **+15 y -20 °C** durante **5 años**.
- En los vacunatorios los frascos liofilizados se conservan entre **2 y 8°C**, durante **1 mes**. Las ampollas de diluyente deben ser conservadas en heladera entre **2° y 8°C**.



Conservar bien, protege la salud

Puntos clave de conservación



Termoestabilidad de la vacuna

Vacuna	Contenido	Conservación Almacenes centrales, provinciales o Temperatura de freezer (-15° a -20 °C)	Conservación Centros de Salud / vacunatorios Temperatura de heladera (2° a 8 °C)
Frasco con liofilizado	10 dosis	5 años	30 días
Ampolla de diluyente agua estéril	5,5 ml	N/C	30 días
Reconstituida	0,5 ml	N/C	12 horas

La correcta conservación garantiza la efectividad y seguridad de la vacuna.

Indicaciones de la vacuna de FHA



- La vacuna está indicada a partir de los **15 años de edad** para personas que residan o desarrollen actividades en el área endémica de la FHA (provincia de Santa Fe, Córdoba, La Pampa y Buenos Aires).



- En dosis única** (población comprendida entre 15 a 65 años).



- La vacunación debe realizarse por lo menos **un mes antes** de una posible exposición.



- Incorporación de vacuna **Candid #1** al **Calendario Nacional**: en el año **2007** (Resolución 48/2007).



*La vacunación
previene la FHA*



**Vacunarse es una medida segura y efectiva
para reducir el riesgo de enfermedad.**



Esquema y vía de administración de vacuna FHA

1  Limpiar la piel del sitio de aplicación con **solución fisiológica o agua destilada estéril** y dejar secar completamente antes de inocular.



2 Se aplica en una dosis única de **0,5 ml** de producto reconstituido, por vía intramuscular, preferentemente en deltoides, utilizando jeringas descartables de 1 ml y agujas 22G x 1.



 **0,5 ml**
IM – Deltoides

Modo de empleo: Reconstitución de la vacuna liofilizada



- 1** Los frascos de vacuna serán **reconstituidos** en el momento de utilizarse. 
- 2** No se debe pasar alcohol u otro desinfectante sobre el tapón de goma de los frascos de vacuna, ya que este procedimiento puede inactivar el virus. 
- 3** Con una jeringa de 10 ml y una aguja 20 Gx1 estériles descartables, agregar lentamente 5,5 ml de **agua estéril** para inyectables evitando formar espuma. 
- 4** Descartar la jeringa y la aguja utilizadas. 
- 5** No agitar ni sacudir el frasco. Rotarlo suavemente y colocarlo en la heladera (no en el congelador ni freezer). 
- 6** No se utilizará el frasco hasta que el material liofilizado se haya disuelto por completo. La disolución **está terminada** cuando el líquido se ve **absolutamente transparente** y sin partículas en suspensión. 
- 7** Cuando se observa completa disolución, la vacuna puede ser usada dentro de las 12 (doce) horas siguientes a la reconstitución, siempre que haya sido conservada en heladera entre 2 y 8 °C, razón por la cual debe realizarse búsqueda activa de los destinatarios y promoción de la búsqueda activa de la población susceptible a ser vacunada. Así como la asignación de días específicos de vacunación, para evitar el descarte de vacunas.

 **Uso dentro de 12 horas**
Mantener en heladera entre 2 y 8 °C

Efectos adversos de la vacuna de FHA

Locales


Dolor o molestias en el sitio de la inoculación, picazón, eritema y leve induración.




Dolor en el sitio de inyección



Picazón



Eritema



Leve induración

Generales

Cefaleas, decaimiento, mialgia, fiebre, náuseas, vómitos, dolor retroocular, mareos, lumbalgia y exantema.

Leucopenia leve ($<4000/\text{mm}$), plaquetopenia leve (<150.000) y microhematuria.



Cefaleas



Decaimiento



Mialgia



Fiebre



Náuseas y vómitos



Dolor retroocular



Mareos



Lumbalgia



Exantema



Leucopenia leve ($<4000/\text{mm}$)



Plaquetopenia leve (<150.000)



Microhematuria

Contraindicaciones de la vacuna de FHA

No debe aplicarse en:



Embarazo

Riesgo potencial para el feto, no se recomienda su uso.



Lactancia

No se recomienda su aplicación durante el período de lactancia.



Déficit inmunitario congénito o adquirido

Puede haber menor respuesta inmune y mayor riesgo de complicaciones.



Además...

Se debe posponer la aplicación ante:



Enfermedades febriles agudas o en curso

Se recomienda esperar a la recuperación para aplicar la vacuna.



Estas contraindicaciones deben ser evaluadas por el personal de salud en cada caso.

Uso simultáneo con otras vacunas de la vacuna de FHA



No se dispone de datos sobre aplicación simultánea con otras vacunas.

Por lo tanto, no se recomienda



Se debe aplicar en esquema exclusivo para ella.

El intervalo mínimo con otra vacuna es de **4 semanas**.

En resumen:

- ✓ No hay evidencia de datos sobre aplicación simultánea con otras vacunas.
- ✓ Aplicar en forma exclusiva y respetar un intervalo mínimo de **4 semanas** con cualquier otra vacuna.



*Más prevención,
mejor salud*

Comentario CABA



Dentro del sistema de salud pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la vacuna de Fiebre Hemorrágica Argentina se aplica en el vacunatorio del **Hospital Muñiz**.



Importante



Una vez recibida la vacuna, no debe donar sangre durante **1 mes**.



La vacuna es efectiva y segura.



Protege contra la fiebre hemorrágica argentina.



Evita la enfermedad en zonas de riesgo.



La vacunación es un acto de prevención y cuidado para la comunidad.

¡Muchas gracias!

Curso PAI · Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez