

VACUNA TRIPLE VIRAL / DOBLE VIRAL

PAI 2026/ MODULO 8

Enfermera Lic. Cristina Belen



PRESENTACION

SRP (Sarampion Rubeola Papera)

Monodosis



DOBLE VIRAL (Sarampion- Rubeola)

Multidosis



Conservación

TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO

Rango obligatorio: Se debe mantener refrigerada de forma constante **entre 2 °C y 8 °C**.

Ubicación en heladera: Debe colocarse en los estantes centrales o superiores de la heladera de uso exclusivo para vacunas.

Nunca debe guardarse en la puerta (por las fluctuaciones de temperatura al abrirla) ni en los estantes inferiores adyacentes a botellas de agua estabilizadoras.

No se debe congelar bajo ninguna circunstancia el frasco ampolla de polvo liofilizado o el solvente, ni una vez reconstituida, el congelamiento daña su estructura.

Altamente fotosensible Tanto el frasco ampolla con polvo liofilizado como la solución y mucho menos una vez reconstituida deberá permanecer resguardado dentro de su empaque de cartón original o protegidos por elementos opacos para evitar la exposición directa a la luz solar o artificial.

Tiempo de uso una vez reconstituida

Frascos multidosis: De acuerdo con las normas de cadena de frío aplicadas en Vacunatorios del país, una vez que el polvo se mezcla con el diluyente, la vacuna pierde estabilidad rápidamente. Se debe utilizar de manera prioritaria e inmediata.

Si se mantiene refrigerada en el rango de 2 °C a 8 °C, el remanente del frasco multidosis es válido **únicamente durante la jornada de labor (máximo entre 6 y 8 horas)**. Al finalizar el día de trabajo, cualquier sobrante debe ser obligatoriamente descartado.

Diluyentes: Los diluyentes específicos correspondientes a cada lote de fabricación de la vacuna también deben estar refrigerados antes de realizar el procedimiento de reconstitución

Preguntas importantes antes de vacunar

- ✓ Edad?
- ✓ Posee carnet de vacuna?
- ✓ Realiza algún tratamiento ? O termino algún tratamiento?
- ✓ Recibió alguna vacuna este mes y cuales?
- ✓ Esta embarazada?
- ✓ Esta con las defensas bajas?
- ✓ Esta o estuvo internado?
- ✓ Le realizaron alguna cirugía en estos meses?
- ✓ Fue necesario una transfusión de sangre?

Recomendaciones importantes antes de vacunar

- Explicar al responsable del niño las vacunas que se le aplicara.
- Explicar como contener al niño para el momento de la aplicación.
- Explicar que no se debe frotar la zona de aplicación al finalizar.
- Dentro de las 24 h a 48 h puede presentar dolor o enrojecimiento en la zona de aplicación.
- Se recomienda colocar paños fríos para aliviar.
- Puede presentar a los 5 o 12 días de aplicación un malestar general, desde dolor hasta fiebre.
- Podrá administrar lo que le indico su pediatra de cabecera.

Contraindicaciones

Absolutas

- Inmunodeficientes severos.
- Mujeres durante el embarazo.
- Trasplantados de órgano sólido.
- Bebés menores de 6 meses.

Transitorias

- No se vacuna, si presento reacciones alérgicas a la proteína de huevo o la neomicina.
- No se vacuna, si esta con fiebre mayor a 38 ° C.
- No se vacuna, si recibió transfusión de sangre en estos 3 meses,
- No se vacuna, si recibió gammaglobulina en estos 3 meses.
- No se vacuna, si esta bajo tratamiento con corticoides o inmunosupresores.
- **No se vacuna, si recibió una vacuna a virus vivo en el mismo mes y no cumple las 4 semanas de intervalo.**

CALENDARIO NACIONAL DE VACUNACIÓN

VACUNAS EDAD	BCG	Hepatitis B	Neomococo Caejgónia II sistema	Pentacelente DT = 140-180 g	IPV	Rotavirus	Meningococo ACWY	Antigripal	Hepatitis A	Triple Viral	Varicela	Triple Bacteriana Acelular	Triple Bacteriana Celular	Virus Papiloma Humano (VPH)	Doble Bacteriana (dT)	Fiebre Amarilla	Fiebre Hemorrágica Argentina
Recién nacido	Única Dosis	dosis Neonatal															
2 meses			1ª dosis	1ª dosis	1ª dosis	1ª dosis											
3 meses							1ª dosis										
4 meses			2ª dosis	2ª dosis	2ª dosis	2ª dosis											
5 meses							2ª dosis										
6 meses				3ª dosis	3ª dosis												
12 MESES			refuerzo					única anual	única dosis	1º DOSIS							
15 meses											1ª dosis						
15 - 18 MESES				1º refuerzo						2º DOSIS							
18 meses															1ª dosis		
24 meses																	
5 AÑOS (ingreso escolar)					1º refuerzo					2º DOSIS							
11 años							única dosis	única anual		única o completar esquema		refuerzo	dos dosis		refuerzo		
A partir de los 15 años		Iniciar o completar esquema														única dosis	único dosis
Adultos			Esquema secuencial												refuerzo cada 10 años		
Embarazadas								vna dosis				una dosis					
Puerperio								vna dosis		Iniciar o completar esquema							
Personal de salud								dosis anual				una dosis					

1º Dosis de Triple viral

2º Dosis de triple viral a todos los nacido a partir de Julio 2004

2º Dosis a partir de los 5 años


ADMINISTRACION

Dosis 0,5 ml



Vía Subcutánea a 45 °

VIA SUBCUTANEA



La importancia de vacunar

EFICACIA

Con 1 dosis: Confiere un **93%** de eficacia general para prevenir el sarampión.

Se aplica normalmente a los **12 meses** de vida.

Con 2 dosis: La eficacia asciende a un **97% o 99%** de protección de por vida, 2 dosis se aplica a los **5 años**.

Modificación del esquema en Argentina

Para maximizar esta eficacia de forma temprana frente a la situación epidemiológica de la región, el Ministerio de Salud modificó el esquema a través de la **Resolución 339/2026**.

Antes: La segunda dosis se aplicaba a los 5 años (ingreso escolar).

El esquema actual (vigente): La segunda dosis **se adelantó y se aplica entre los 15 y 18 meses de edad** (para los niños nacidos a partir de julio de 2024). Esta medida busca cerrar de manera anticipada la "ventana" de susceptibilidad y garantizar el 97% de inmunidad antes de los dos años de edad. **Eficacia Colectiva (Efecto Rebaño)** Para que la altísima eficacia individual de la vacuna funcione como una barrera epidemiológica real, la [Organización Panamericana de la Salud \(OPS\)](#) establece que se necesita mantener una **cobertura comunitaria superior al 95%**. Cuando los niveles de vacunación de la población bajan de ese umbral, se pierde la inmunidad colectiva y pueden reemerger brotes aislados.

¡Muchas gracias!

Curso PAI · Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez