

Vacuna Covid-19

PAI 2026/MODULO 8

Lic. Enf. Sanchez Calderon, Elisa

VACUNAS DISPONIBLES EN ARGENTINA

Comirnaty (Pfizer)

ARNm Sintético

Instrucciones de ARN mensajero en nanopartículas lipídicas.

Cepas: Monovalente Ómicron JN.1



DISPONIBLE EN
HOSPITALES
CESAC Y POSTAS

ARVAC Cecilia Grierson

Subunidad Proteica

Proteína recombinante purificada con adyuvante de aluminio.

Cepas: Bivalente (Gamma / Ómicron)



DISPONIBLE EN
PRIVADOS

Almacenamiento y Logística

Comirnaty (Pfizer)

Cadena de Frío Ultrafría

Requiere ultracongelación o rangos específicos estrictos según su formulación comercial antes del uso.

Fase de Descongelación

✓En heladera convencional: Los viales se trasladan a una temperatura de entre 2 °C y 8 °C para una descongelación gradual (lo que toma aproximadamente 2 horas para paquetes o viales agrupados).

✓Una vez que el vial es perforado, abierto o diluido, su tiempo de estabilidad se reduce drásticamente. Debe utilizarse dentro de un plazo muy estricto de pocas horas (por lo general, un máximo de 6 horas conservado a temperatura ambiente o controlada).

ARVAC Cecilia Grierson

Refrigeración Estándar

Se almacena entre 2 °C y 8 °C (heladera convencional), facilitando su distribución federal en Argentina.

- ✓No requiere de freezers especiales ni de cadenas de ultra-frío
- ✓Protección contra la Luz y el Congelamiento
- ✓Evitar la congelación: Al igual que la mayoría de las vacunas con adyuvantes de aluminio, no debe congelarse. Si un lote se congela, pierde su estabilidad y eficacia, por lo que debe descartarse.
- ✓Protección lumínica: Los viales deben mantenerse protegidos de la luz directa (en sus envases originales) dentro del refrigerador.
- ✓Facilidad de Manipulación Operativa

A TENER EN CUENTA DE LA VACUNA:



Esto indica la **nueva fecha límite de caducidad calculada a partir del momento en que se descongeló** el producto para su conservación en heladera estándar.

Presentación, dosis y vía de administración

- Cada caja contiene 10 viales
- 1vial = 6 dosis de 0,3 ml de vacuna.
- Vía de administración: intramuscular.
- Sitio de aplicación: músculo deltoides (el tercio superior externo del hombro externo).

Esquema de Vacunación

Comirnaty (Pfizer)

Población: Desde 12 años

Esquema de refuerzos según lineamientos nacionales de inmunización vigentes.

ARVAC Cecilia Grierson

Población: Mayores de 18 años

Indicada fundamentalmente como dosis de refuerzo en población adulta.

Sitio de Aplicación y Efectos Adversos

Comirnaty (Pfizer)

Efectos locales (muy frecuentes): Dolor, edema o hinchazón y enrojecimiento en el sitio de la inyección.

Efectos generales / sistémicos (muy frecuentes):

Cefalea, fatiga, fiebre transitoria, escalofríos, mialgias (dolores musculares), artralgias (dolores articulares) y diarrea.

ARVAC Cecilia Grierson


Efectos locales: Dolor leve o moderado, sensibilidad, induración o enrojecimiento en el sitio de la aplicación del brazo.

Efectos sistémicos leves: Cefalea, cansancio o fatiga leve, febrícula pasajera y dolores musculares leves en las primeras 24 a 48 horas posteriores a la dosis.

Acción de enfermería ante la vacunación:

Preparación de las dosis:

- Mezcle suavemente los viales invirtiéndolos diez veces antes de su uso. No los agite.
- Antes de mezclarla, la dispersión descongelada puede contener partículas amorfas de color entre blanco y blanquecino.
- Después de mezclarla, la vacuna debe tener el aspecto de una dispersión entre blanca y blanquecina sin partículas visibles. No utilice la vacuna si presenta partículas visibles o un cambio de color.
- Cada dosis debe contener 0,3 ml de vacuna.
- Si la cantidad de vacuna restante en el vial no puede proporcionar una dosis completa de 0,3 ml, deseche el vial y el volumen sobrante. No mezclar excedentes de vacunas de varios viales.
- Anote la hora y la fecha apropiadas en el vial. Deseche la vacuna que no ha sido utilizada 12 horas después de la primera punción.



ESQUEMA DE VACUNACION COMINARTY OMICRON JN.1 PFIZER

POBLACION SIN INMUNOCOMPROMISO

EDAD	ESQUEMA	CANTIDAD DE DOSIS- INTERVALOS	DOSIS A ADMINISTRAR
A APARTIR DE LOS 12 AÑOS	Esquema inicial	1 dosis	0,3ml
	Refuerzo	1dosis A los 12 meses del esquema inicial y repetir anualmente	0,3ml

POBLACION CON INMUNOCOMPROMISO

EDAD	ESQUEMA	CANTIDAD DE DOSIS- INTERVALOS	DOSIS A ADMINISTRAR
A APARTIR DE LOS 12 AÑOS	Esquema primario	2 dosis (considerar una o varias dosis adicionales según condición clínicas. intervalo mínimo: 2 meses)	0,3ml
	Refuerzo	1dosis A los 6 meses de la última dosis del esquema inicial y repetir cada 6 meses.	0,3ml

Vacunación durante el embarazo y la lactancia

El Ministerio de Salud de la Nación recomienda la vacunación contra COVID-19 en embarazadas en cualquier trimestre del embarazo, incluyéndose como un grupo específico priorizado dentro de la población objetivo. La recomendación surge del análisis de la evidencia disponible sobre el riesgo aumentado de enfermedad grave o muerte por COVID-19 en embarazadas y de los datos de eficacia/efectividad y seguridad de la vacunación contra COVID-19. Se recomienda su vacunación para quienes, en el ejercicio de su autonomía personal o familiar, decidan aplicársela.

Intervalo luego de infección por COVID-19

Las personas con infección reciente y documentada por SARS-CoV-2 deben haberse recuperado de la infección aguda y cumplir los criterios de alta antes de recibir una dosis de la vacuna. Además, dado el bajo riesgo de re infección poco después de una infección previa, se recomienda esperar hasta tres meses después de la infección para recibir una dosis de la vacuna.

¡Muchas gracias!

Curso PAI · Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez