



## Aspectos Programáticos de la vacunación COVID-19 2025

*Eci Lic. Elizabeth Beltrán*

### Introducción

El Plan Estratégico de Vacunación contra la COVID-19 en Argentina establece que la vacunación es voluntaria e independiente de haber padecido la enfermedad. La priorización de la población objetivo a vacunar se realiza inicialmente en función de la condición con riesgo de enfermedad grave o de exposición y al grado de vulnerabilidad.

La vacunación contra COVID-19 representa un gran desafío para el equipo de salud, es fundamental conocer las distintas características de los inmunobiológicos relacionados con su conservación, aplicación y esquemas de acuerdo a la edad y condición de base


*En este documento desarrollaremos los aspectos más relevantes de la cadena de frío almacenamiento, manipulación y administración de las vacunas COVID-19 en el día a día del Vacunatorio. (el tema completo se desarrollará en el Módulo de COVID-19).*

### Aspectos programáticos de la vacunación COVID-19

#### CARACTERÍSTICAS DE LAS VACUNAS ARGENTINA MAYO 2026

##### Spikevax – Comirnaty – ARVAC

- **Nombre: Spikevax (formulación 0.10 mg/ml)**





- Nombre: Spikevax® (Moderna) (formulación 0.10 mg/ml)
- Autorizado edad:  $\geq 6$  meses
- Plataforma: ARN mensajero
- Conservación:  $-50^{\circ}$  a  $-15^{\circ}\text{C}$  hasta la fecha de caducidad
- $2^{\circ}$  a  $8^{\circ}\text{C}$  hasta 30 días
- Aplicar dentro las 12 hs abierto el vial.
- Autorizado para dosis primario y refuerzo
- Intervalo mínimo de 4 meses (120 días) desde la última dosis recibida
- Contraindicaciones: anafilaxia o reacción alérgica grave inmediata a la administración de la primera dosis.



- **Nombre: COMIRNATY** Desarrollador: Pfizer-BioNTech
- Autorizado edad:  $\geq 12$  años
- Plataforma: ARN mensajero
- Presentación: vial de multidosis de 2,25ml ( 6 dosis de 0,3mlc/u)
- Inicio de esquemas y refuerzos
- Contraindicaciones: Anafilaxia o reacción alérgica grave inmediata a la administración de la primera dosis.
- Dosis: 0,3 ml
- Vía de administración: intramuscular.
  - Sitio de aplicación: músculo deltoides.
  - Advertencia: Si la cantidad de vacuna que queda en el vial no puede proporcionar una dosis completa de 0,3 mL, debe desechar el vial y cualquier exceso de volumen
  - NO mezclar excedentes de vacunas de varios viales.



|                                          | COMIRNATY<br>MONOVARIANTE,<br>Omicron XBB.1.5                        | SPIKEVAX de MODERNA<br>MONOVARIANTE,<br>Omicron XBB.1.5                                                                                                                                               |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Plataforma                               | ARNm                                                                 |                                                                                                                                                                                                       |
| Presentación actual en Argentina         | Vial multidosis de 2,25mL (6 dosis de vacuna de 0,3 ml c/u).         | Vial multidosis (se pueden extraer 5 dosis de 0,5 mL cada una, 10 dosis de 0,25 mL cada una o 2 dosis de 1,0 mL cada una)                                                                             |
| Conservación                             | -90 a -60°C (hasta fecha de caducidad)<br>+2 a +8°C hasta 10 semanas | -50 a -15°C (hasta fecha de caducidad)<br>+2 a +8°C hasta 30 días                                                                                                                                     |
| Recomendaciones luego de abierto el vial | Aplicar el contenido dentro de las 12 hs de abierto el vial          | Aplicar el contenido dentro de las 12 hs de abierto el vial                                                                                                                                           |
| Número de dosis                          | Inicio de esquema y refuerzo a partir de 12 años                     | Inicio de esquema y refuerzo a partir de los 6 meses                                                                                                                                                  |
| Volúmen de cada dosis                    | 0,3 mL                                                               | 0,25 mL entre 6 meses a 11 años inclusive<br>0,5 mL a partir de 12 años                                                                                                                               |
| Autorización de uso                      | A partir de 12 años                                                  | A partir de 6 meses                                                                                                                                                                                   |
| Acceso al manual del vacunador           |                                                                      | <a href="https://www.argentina.gob.ar/coronavirus/vacuna/equipos-salud/lineamientos-manual-vacunador">https://www.argentina.gob.ar/coronavirus/vacuna/equipos-salud/lineamientos-manual-vacunador</a> |

- **Nombre: ARVAC (Pfizer- BionTech)**



- Autorizado edad:  $\geq 18$  años
- Plataforma: recombinante subunidad proteica
- Presentación :vial de multidosis(10-50-10 dosis) y vial monodosis
- Refuerzo de esquemas de vacunación contra COVID-19
- Contraindicaciones: Anafilaxia o reacción alérgica grave inmediata a la administración de la primera dosis.
- Dosis: 0,5 ml
- Vía de administración: intramuscular.
- Sitio de aplicación: músculo deltoides.
- Conservación: 2 a 8°C, no congelar

Precauciones:



- Enfermedades agudas graves (infecciosas y no infecciosas) o exacerbación de enfermedades crónicas, que impliquen compromiso del estado general (ej. asma grave no controlado).
- Antecedentes de anafilaxia de cualquier origen, incluyendo medicamentos, otras vacunas o alimentos: Consultar al/la alergista de cabecera y vacunación en ambiente controlado.

## EVENTOS ADVERSOS

Los eventos adversos (EA) característicos identificados en estudios clínicos, así como en estudios de otras vacunas, son principalmente leves o moderados y pueden desarrollarse en el transcurso del primer o segundo día después de la vacunación, resolviendo dentro de los 3 días posteriores.

En caso de presentar efectos secundarios como fiebre, mialgias o dolor local, se puede indicar tratamiento sintomático si es necesario: antihistamínicos y/o antitérmicos. El uso de estos medicamentos en estudios clínicos no ha demostrado interacciones farmacológicas.

La experiencia argentina en relación a la vigilancia de la seguridad de las vacunas contra la COVID-19 a través de la notificación pasiva de los ESAVI (eventos supuestamente atribuibles a la vacunación o inmunización) se publica en informes periódicos que se encuentran disponibles en: <https://www.argentina.gob.ar/coronavirus/vacuna/equipos-salud/informes-seguridad>.

## OTRAS CONSIDERACIONES DE IMPORTANCIA EN CONTEXTO DE LA CAMPAÑA DE VACUNACIÓN

La protección de la vacuna no es inmediata. Los esquemas de vacunación contemplan un esquema inicial de 1 ó 2 dosis (según vacuna que se utilice) y tomará al menos 2 semanas luego del esquema completo para considerar que la protección es adecuada. Es fundamental continuar con las dosis de refuerzos que correspondan con el objetivo de mantener la protección a lo largo del tiempo. Ninguna vacuna es 100% efectiva (la enfermedad puede ocurrir, y si ocurre suele presentarse atenuada).



No se recomienda la realización de pruebas serológicas para evaluar la inmunidad contra la COVID-19 posterior a la vacunación dado que a la fecha se desconoce el correlato serológico de protección inmunológica dificultando la interpretación de los resultados obtenidos.

## BIBLIOGRAFÍA:

- Lineamiento técnico recomendaciones vigentes para la Campaña Nacional Vacunación contra la COVID
- Min Salud Argentina 2025 Memorándum uso de vacuna monovariante Comirnaty jn.1 contra covid-19 del laboratorio Pfizer en personas desde los 12 años de edad <https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/if-2025-137493813-apn-dncetms.pdf>
- Ministerio de salud de la República Argentina 2025
- <https://www.argentina.gob.ar/coronavirus/vacuna/equipos-salud/informes->
- Gobierno de la ciudad de Buenos Aires 2024
- Programa de Inmunizaciones- DG Enfermería 2023
- Dirección General de Atención Primaria 2023
- Ministerio de Salud Ciudad de Buenos Aires 2023
- Comisión Nacional de Inmunizaciones (CoNaiN) y en consenso con el Consejo Federal de Salud (COFESA) 2023
- Gerencia Operativa de Enfermería 2023  
[https://www.who.int/publications/i/item/WHO-2019-nCoV-vaccines-SAGE\\_recommendation-AZD1222-2021.1](https://www.who.int/publications/i/item/WHO-2019-nCoV-vaccines-SAGE_recommendation-AZD1222-2021.1)
- Este manual del vacunador, así como otros lineamientos, manuales y recomendaciones para el equipo de salud sobre vacunación COVID-19, fueron realizados por el equipo de la DICEI y están disponibles en: <https://www.argentina.gob.ar/coronavirus/vacuna/equipos-salud/lineamientos-manual-vacunador>



- Memorándum uso de vacuna monovariante SPIKEVAX XBB.1.5 contra COVID-19 del laboratorio Moderna en personas desde los 6 meses de edad Abril 2024  
<https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/if-2024-40572594-apn-dcei-ms.pdf>
- Lineamientos Técnicos y Manual de Vacunación. Vacuna COMINARTY MONOVARIANTE Ómicron XBB.1.5 (Vacuna COVID-19 ARNm, Pfizer monovariante) Agosto 2024  
[https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/2021/01/lineamiento\\_tecnico\\_pfi\\_zer\\_monovariante\\_692024.pdf](https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/2021/01/lineamiento_tecnico_pfi_zer_monovariante_692024.pdf)
- Argentina. Memorándum uso de vacuna monovariante Comirnaty JN.1 contra COVID-19 del Laboratorio Pfizer en personas desde los 12 años de edad .  
<https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/if-2025-137493813-apn-dncetms.pdf>